





DESINFEKTIONSPLAN für den Kindergarten

WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION/ EINWIRKZEIT	WIE	WER	
 Haut & Hände Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Nach jedem Wickeln. Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem. Bei erhöhter Infektionsgefahr mehrmals täglich. Bei Bedarf.	megroMan	3 ml – 30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter
 Haut & Hände Reinigung	Händewaschung	Vor Arbeitsbeginn. Nach Arbeitsende. Nach der Toilettenbenutzung. Wenn die Hände sichtbar verschmutzt oder klebrig sind. Bei Bedarf.	DESCOSOFT SENSITIVE DESCOSAN		Präparat mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen und Schmutzreste sowie organische Anschmutzungen gründlich entfernen. Abtrocknen mit Einmaltuch.	Alle Mitarbeiter
 Haut & Hände Pflege	Hand-/Hautpflege	Bei Bedarf.	BIALIND JOBALAN		Hautpflegecreme auf die trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Alle Mitarbeiter
	Hautschutz	Bei Bedarf.	DESOLIND PROTECT PROLIND HAUTSCHUTZ-CREME SENSITIVE		Hautschutzcreme in die trockenen Hände einschließlich Fingerzwischenräume, Handgelenk und Nagelbetten gründlich einreiben.	Alle Mitarbeiter
 Fläche	Fieberthermometer	Nach Gebrauch.	megroSept	Konz. - 1 Min.	Mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch vollständig abwischen.	Alle Mitarbeiter
	Spielzeug	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem).	megroSept megroCid	Konz. - 1 Min. 1,0 % - 60 Min. 2,0 % - 30 Min. 2,5 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeiter
	Wickeltischauflage	Nach Gebrauch.	megroSept	Konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Arbeitsflächen, Inventar, Wickeltisch	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem).	megroSept megroCid	Konz. - 1 Min. 1,0 % - 60 Min. 2,0 % - 30 Min. 2,5 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Fußböden	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem).	megroCid	1,0 % - 60 Min. 2,0 % - 30 Min. 2,5 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Toilette, Waschbecken	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem).	megroCid	1,0 % - 60 Min. 2,0 % - 30 Min. 2,5 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
Sonstiges	Berufskleidung	Sofortiger Wechsel nach Kontamination.	THERMOTON WASHTEX		Von Privatkleidung getrennt aufbewahren. Desinfizierendes Waschverfahren.	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung: Chemikaliendichte Schutzhandschuhe Einmalhandschuhe	Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Beim Umgang mit Ausscheidungen, Blut, Erbrochenem. Bei Bedarf.			Nach Gebrauch entsorgen.	Alle Mitarbeiter

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im **MEGRO WIPES** Spendersystem eingesetzt werden. Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.